

PROCESSIONÁRIA DO PINHEIRO

Thaumtopoea pityocampa Schiff.
Lepidoptera, Thaumtopoeidae

- **ASPECTOS GERAIS;**
- **MÉTODOS DE CONTROLO ACONSELHADOS EM ZONAS HABITADAS;**
 - **PERÍODO DE OUTONO** (meados de setembro/fins de outubro);
 - **PERÍODO DE INVERNO** (novembro até à descida dos ninhos);
 - **PERÍODO DA PRIMAVERA** (meados de fevereiro/fins de maio);
- **CUIDADOS DE SAÚDE**

ASPECTOS GERAIS

Trata-se de um inseto desfolhador dos pinheiros e cedros.



Foto1 – FONTE: Ferreira, M.C.; Ferreira, G.W.S., 1990 - Pragas das Resinosas. *Guia de Campo n.º 3*. Série Divulgação. DGPA. Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação.

Os ataques variam de intensidade de acordo com os seus níveis populacionais, fortemente influenciados pelas condições climáticas.

Em termos de produção lenhosa, verifica-se uma redução do crescimento das árvores no período em que ficam desfolhadas.

No entanto, à exceção de ataques sucessivos em árvores jovens, estas em geral recuperam e não morrem.

Em termos de saúde pública, a processionária pode representar, no entanto, um problema sério, sobretudo em anos de níveis populacionais elevados e junto a locais habitados.

Em termos de produção lenhosa, verifica-se uma redução do crescimento das árvores no período em que ficam desfolhadas. Como todos os insetos, desenvolve-se passando por fases que são:

- Ovo
- Lagarta
- Pupa ou crisálida (casulo)
- Inseto adulto (borboleta)



Foto2 – FONTE: Ferreira, M.C.; Ferreira, G.W.S., 1990 - Pragas das Resinosas. *Guia de Campo n.º 3*. Série Divulgação. DGPA. Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação

As lagartas passam por 5 estádios de crescimento.

A partir do 3º estágio possuem pêlos urticantes que causam alergias na pele, globo ocular e aparelho respiratório.

Estas alergias são sempre muito desagradáveis e podem ter consequências graves, dependendo da sensibilidade do indivíduo atingido.

MÉTODOS DE CONTROLO ACONSELHADOS EM ZONAS HABITADAS

- **PERÍODO DE OUTONO (MEADOS DE SETEMBRO/FINAIS DE OUTUBRO)**

- **LAGARTAS NOS 1.º E 2.º ESTÁDIOS DE CRESCIMENTO (8-10 mm de comprimento)**



Foto3 – FONTE: Ferreira, M.C.; Ferreira, G.W.S., 1990 - Pragas das Resinosas. *Guia de Campo n.º 3*. Série Divulgação. DGPA. Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação.

Nesta altura são bastante eficazes os tratamentos químicos.

Dispõe-se hoje em dia de dois grupos de produtos, de baixa toxicidade e pouco danosos em termos ambientais:

1. Inibidores de crescimento cujas substâncias ativas são o **diflubenzurão** e a **Tebufenozida**;
2. Inseticidas microbiológicos à base de **Bacillus thuringiensis**, de que existem várias formulações no mercado.

A eficácia depende muito de uma correta aplicação, pelo que esta deve ser efetuada por pessoal habilitado.

Não esquecer que a aplicação de produtos químicos com recurso a meios aéreos deve ser comunicada, com pelo menos 8 dias de antecedência, às Direções Regionais de Agricultura e Pescas e às Administrações Regionais de Saúde (Lei n.º 10/93, de 6 de Abril).

Caso seja necessário usar estes meios, cumpra esta obrigação legal.

- **PERÍODO DE INVERNO (DE NOVEMBRO ATÉ À DESCIDA DOS NINHOS)**



Durante este período, as lagartas evoluem do 3.º para o 5.º estágio. Aparecem os pêlos urticantes. Constroem os típicos ninhos de Inverno. Mantêm os hábitos de alimentação crepuscular e noturno, permanecendo no ninho durante o dia. Este funciona como acumulador térmico.

Os **inibidores de crescimento** atuam, mas o seu efeito demora a fazer-se sentir (as lagartas morrem quando mudam de estágio) e as condições atmosféricas não são em geral favoráveis à sua aplicação. Mais **eficazes** são os **métodos de destruição mecânica dos ninhos**.

Foto4 – FONTE: Ferreira, M.C.; Ferreira, G.W.S., 1990 - Pragas das Resinosas. *Guia de Campo* N.º 3. Série Divulgação. DGPA. Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação.

Por vezes estes encontram-se a alturas dificilmente alcançáveis a partir do solo, mesmo recorrendo ao uso de varas ou tesoura apropriadas com cabo extensível.

Pode tornar-se necessário o recurso a escadas (telescópicas ou clássicas).

Quando por terra, o **ninho** deve ser **queimado**.

NOTA:

O clássico método do tiro de caçadeira **não deve** ser usado em **zonas habitadas**.

- **PERÍODO DA PRIMAVERA (MEADOS DE FEVEREIRO/FINAIS DE MAIO)**



Foto5 – FONTE: Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentacion, 1992 – *Plagas de Insectos en las Masas Forestales Españolas*. Segunda edición

As lagartas de 5.º estágio, após atingirem o seu desenvolvimento completo, abandonam os ninhos e dirigem-se em **procissão** (daí o nome de Processionária) para o solo, onde se enterram para passar à fase seguinte de pupa ou crisálida e evoluir para a de inseto adulto que emerge no Verão, completando assim o seu ciclo anual.

A destruição mecânica das lagartas é, nesta altura, o método mais eficaz a usar.

Deve-se:

- Tentar capturá-las quando descem pelo tronco cintando este, numa extensão de 0,50 m a 1 m, com plástico ou papel embebidos nas duas faces com **cola inodora** à base de **poli-isobutadieno**;
- No solo, juntá-las com o auxílio de um ancinho, vassoura de jardinagem ou qualquer outro utensílio semelhante;
- Queimá-las ou esmagá-las com suavidade para não provocar a projeção dos pela como reação defensiva;
- Se se conseguir identificar o local de enterramento, em geral situado em zona soalheira nos climas frios e temperados ou perto das árvores de origem nas zonas de clima mais quente, deve-se cavar o solo de modo a expor as pupas já formadas ou as lagartas que lograram enterrar-se. Dependendo da textura do solo a profundidade varia até um máximo de 10-15 cm.

NOTA:

- Os meses do ano indicados são os que correspondem ao ciclo de vida em anos normais do ponto de visto climático.
- São, no entanto, possíveis e naturais, algumas flutuações no início e final dos períodos indicados.

CUIDADOS DE SAÚDE

ATENÇÃO:

- **A partir do 3.º estágio (fins de Outubro até ao enterramento) as lagartas possuem pêlos urticantes.**
- **Estes pêlos, para além do corpo das lagartas encontram-se espalhados pelos ramos e nos ninhos.**
- **Ao realizar qualquer dos tratamentos aconselhados, deverá:**
 - ✓ Usar luvas;
 - ✓ Proteger o pescoço;
 - ✓ Proteger os olhos, usando óculos apropriados;
 - ✓ Usar máscara de proteção no nariz e boca;
 - ✓ Seguir as normas de segurança de aplicação constantes nos rótulos de cada produto.
- **Nas escolas e outros locais onde estejam presentes crianças, impedir, sempre que possível, o seu acesso à zona das árvores atacadas sobretudo na altura em que as lagartas descem da árvore.**
- **Em caso de aparecimento de sintomas de alergia, consulte de imediato o posto médico mais próximo.**